

E. aberrations diverses:

<i>pseudofemina</i> <i>Inversa</i>	(Fagnoul) (Austaut)	Mâle, comme femelle. Femelle, comme le mâle. Claire.
<i>complexa</i>	(Eisner)	-Pas de 17. -Déplacement de B, qui vient en contact avec A, par rétrécissement des ailes antérieures. (voir photo →).
<i>zorro</i>	(Descimon)	Variations diverses pouvant affecter, entre autres, 4 et 6 disparus, mais surtout A, B et 1, 2, 3. (voir photo →).
<i>asymetrica</i>	(Stauder)	Dessins asymétriques.
<i>minuscula</i>	(Verity)	-Très petite dimension. -Ailes antérieures: moins de 28 mm. (Cité par Bryk).(*)
<i>majuscula</i>	(Turati)	Grande dimension. Ailes antérieures jusqu'à 70 mm. (Cité par Stichel).
<i>albidociliata</i> <i>albofimbriata</i> <i>rubricollis</i>	(Bryk) (Stauder) (Fagnoul)	Franges, couleur crème. Franges, blanc pur. Pilosité du collier du même rouge que les ocelles.
<i>derennei</i>	(Mezger)	Tête, thorax, abdomen, gris jaune, au recto/verso, plus les nervures aux ailes postérieures.

(*)Mr J.QUINT, Mail du Centre.2, Allée Hector Berlioz. 95130. FRANCONVILLE, possède un exemplaire remarquable de cette forme.