

II A. Pupilles rouges supplémentaires :



Il semble que l'apparition d'une pigmentation rouge, ne puisse se faire qu'au sein d'une étroite bande structurante (F. NIJHOUT).

Le rouge qui peut se manifester par ailerons sur les taches basales correspond à une autre "bande" peu ou pas développée.



1. Ailes antérieures :

RECTO :

<i>pseudonomion</i>	(Christ)	1	
<i>albosignata</i>	(Schultz)	1	Rouge , pupillé de blanc
<i>deseps</i>	(Bryk)	1 + 2	
<i>tripicta</i>	(Kamme)	1 + 2 + 3	
<i>perfecta</i>	(Fagnoul)	1 + 2 + 4	
<i>unipupillata</i>	(Rebel)	2	
<i>bipupillata</i>	(Bryk)	2 + 4	
<i>polyphemus</i>	(Bryk)	4	
			<i>/quadropicta</i> (N.C.) 1+2+3+4

VERSO :

<i>non dénommé</i>		2	(ou 1 + 2)
<i>albicincta</i>	(Osthelder)	2	avec anneau blanc
<i>albipupillata</i>	(Osthelder)	2	avec centre blanc
<i>subcentrica</i>	(Turati)	4	
<i>nigrosecta</i>	(Below)	4	Rouge + coupé par trait noir.

1. ailes antérieures :



2. ailes postérieures :



2. Ailes postérieures :

RECTO :

<i>ocellorubroconjuncta</i>		5 + 6	Réunis par trait rouge, bordé de noir
<i>marginepupillata</i>	(Bryk)	7	Rouge
<i>tripupillata</i>	(Stauder)	7	avec centre blanc (femelle)
<i>tetradynomos</i>	(Stauder)	7+8	avec centre blanc
<i>decora</i>	(Schultz)	7+8	Rouges
<i>decoratissima</i>	(Verly)	7+8+9	<i>decora</i> plus extrême
<i>semidecora</i>	(Bryk)	8	Rouge
<i>kailasiophana</i>	(Bryk)	8+9	(7+8+9) = en bandelette au verso

VERSO :

<i>rubrofasciata</i>	(Fagnoul)	5+6	réunis par trait rouge bordé de noir.
<i>marschneri</i>	(Bryk)	7 + 8	avec centre blanc
<i>rubrocatenata</i>	(Stauder)	9	recto noir
<i>excelsior</i>	(Stichel)	10+11+12+13	+ 10 apparent au RECTO (Rgc)
<i>biornata</i>	(Osthelder)	10+11+12+13	+ 10 et 11 apparents au RECTO (R.)
<i>normanniides</i>	(Bryk)	10+11+12+13	sans rouge
<i>leucophora</i>	(Bryk)	10+11+12+13	très rouges et pupillés.
<i>praetexta</i>	(Gelpke)	10+11+12+13	rouges recto/verso.
<i>basireducta</i> (Note 1).	(Fagnoul)	10+11+12+13	rouges et avec les taches basales noires du recto, réduites et très limitées.