

B . variations des ocelles :

1. variations dans la couleur des ocelles (et taches diverses),

<u>" 5 + 6 "</u> : <u>Recto</u> :		
<i>brunneomaculata</i>	(Stichel)	Rouge-brun sombre
<i>limoniti</i>	(Bryk)	Brun ochracé
<i>cinophtalmos</i>	(Stauder)	Rouge vin, reflet violet
<i>pyrophora</i>	(Stauder)	Rouge feu (mélange rouge et jaune)
<i>rossaceomaculata</i>	(Stauder)	Rouge rosé (Note 2).
<i>aurantiacomaculata</i>	(Stauder)	Jaune doré, opalescent'
<i>hydrargyrostigma</i>	(Stauder)	Normale, mais centre opalescent
<i>ladogensis</i>	(Bryk)	Jaune clair.
<i>intertexta</i>	(Stichel)	Anneau clair (orange), entre le rouge et le noir.
<i>expupillata</i>	(Rödl)	Rouge fort, sans centre blanc.
<i>albomaculata</i>	(Muščamp)	Blanc, sans trace de rouge
<i>uniabocentra</i>	(Bryk)	5 , seul est rouge, sans centre blanc.
<i>anthosticta</i>	(Stauder)	Centre jaune au lieu de blanc.
<u>" 5 + 6 " recto + verso :</u>		
<i>zirpsi</i>	(Bryk)	Rouge fort, sans centre blanc
<i>caeca</i>	(Turati)	5 et 6 noirs. + ou - traces de rouge au verso
<i>semicaeca</i>	(Tengblad)	5 , seul est noir
<i>nigrocellata</i>	(Eisner)	5 et 6 noirs R/V. Pas de rouge..
<i>luctifera</i>	(Verity)	Noirs. Traces de rouge au recto
<i>semiflavocellata</i>	(Eisner)	ocelles jaunes d'un seul côté.

" 5+6+10+11+12+13 "

recto et verso :

flavomaculata (Deckert) Les taches rouges sont jaunes + 1.2.4.7.8.9 ?

" 4 " :

<i>caeruleopunctata</i>	(Koschabeck)	4 rempli de bleu
2. variations des ocelles, forme, anneau , aspect en général :		
<i>philippi</i>	(Schultz)	5 + 6 sans entourage noir (anneau)
<i>omicron-apertum</i>	(Stauder)	5 + 6 Pourtour des ocelles ouvert en haut.
<i>laticincta</i>	(Bryk)	5 + 6 Entourage noir élargi
<i>tenuicincta</i>	(Verity)	5 + 6 Entourage noir très fin
<i>fractecingulata</i>	(Stauder)	5 + 6 Entourage fin et fragmenté
<i>inaeuvata</i>	(Turati)	5 Verso seul : 1/2 grandeur.
<i>comma-fissum</i>	(Stauder)	5 Terminé par un appendice noir en forme de virgule.
<i>commatostigma</i>	(Stauder)	5 Marqué d'une virgule rouge, finement bordé de noir.
<i>profluata</i>	(Ostheder)	5 Pourtour prolongé par un trait noir le long du bord antérieur.
<i>cuneifera</i>	(Stauder)	5 En forme de coin
<i>azona</i>	(Stauder)	5 Sans pourtour noir (6, en a quelques traces).
<i>lacrimans</i>	(Marschner)	5 Rouge en forme de larme, se répand dans la tache basale.
<i>subfuscocrimans</i>	(Ostheder)	5 Verso. Nuage rouge entre 5 et seconde tache basale.
<i>musagetae</i>	(Stauder)	6 Nettement plus petit que 5.
<i>steimmigi</i>	(Stauder)	6 Forme régulière d'un croissant de lune.
<i>reniformis</i>	(Stauder)	6 En forme de rein.
<i>pseudocorybas</i>	(Stauder)	6 En forme de cœur (Pointe dirigée obliquement, en avant).
<i>appendiculata</i>	(Turati)	6 Allongé vers 8, 9 en forme d'appendice noir, parfois terminé par un petit oeil additional.
<i>siepeni</i>	(Stauder)	6 Semblable, avec appendice détaché.
<i>bachmetjevi</i>	(Ugrjumow)	6 Divisé par un trait noir
<i>graphica</i>	(Stichel)	6 Coupé par un trait rouge
<i>tracomophthalmos</i>	(Bryk)	6 Centre blanc, mais écailles noires dans le rouge.
<i>microstigma</i>	(Turati)	5 + 6 Réduite à de petites taches rouges
<i>semiluctifera</i>	(Turati)	5 + 6 5 réduit à un petit point noir, 6 à une petite tache rouge.
<i>binocularis</i>	(Bryk)	5 + 6 Nettement centrés de blanc
<i>magnipupillata</i>	(Rödl)	5 + 6 Centre blanc des ocelles très agrandi.
<i>hecate</i>	(Stauder)	5 + 6 Entourage très épais, avec seul un point rouge central.
<i>quadratula</i>	(Stauder)	5 + 6 De forme carrée.